

INFORMAÇÃO DE QUALIDADE PARA O PRODUTOR DA FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO SUL.

O Boletim da Pecuária tem por objetivo proporcionar aos produtores rurais de Uruguai-na-RS e região um informativo mensal com dados do mercado e informações para orientá-los na tomada de decisões.

NESTA EDIÇÃO:

Cotações	.01
Carne no Varejo	.02
Vacinas	.02
Medicamentos	.03
Insumos pecuários	.04
Relações de troca	.04
Texto Técnico	.05

O Boletim da Pecuária é um projeto de extensão do curso de Medicina Veterinária, desenvolvido pelo CTPEC/Unipampa.

Coordenação:

Prof. Ricardo Pedroso Oaigen
Bruna Brandão

Acadêmicos envolvidos:

Ana Gabriela da Rosa
Renata Garcez do Amaral
Guilherme De David
Talisson Ribeiro

COTAÇÕES

Bovinocultura de Corte *

	Unidade	Preço(R\$)	Variação Mensal
Boi Gordo (Fronteira Oeste)	Kg Vivo	R\$ 9,57	↑ 8%
	Kg Carcaça	R\$ 19,00	↑ 6%
Boi Gordo (Cepea)	Kg Vivo	R\$ 10,05	0%
Vaca Gorda	Kg Vivo	R\$ 8,68	↑ 8%
	Kg Carcaça	R\$ 18,00	↑ 6%
Vaca de Invernar	Kg Vivo	R\$ 8,70	↑ 10%
Terneiro	Kg Vivo	R\$ 12,60	↑ 5%
Terneira	Kg Vivo	R\$ 11,57	↑ 2%
Novilho sobreano	Kg Vivo	R\$ 11,24	↑ 11%
Novilha Sobreano	Kg Vivo	R\$ 11,45	↑ 21%

Ovinocultura *

	Unidade	Preço (R\$)	Variação Mensal
Cordeiro	Kg Vivo	R\$ 7,98	↓ -2%
Borrego	Kg Vivo	R\$ 7,54	↓ -4%
Capão	Kg Vivo	R\$ 6,59	↓ -2%
Ovelha	Kg Vivo	R\$ 6,25	↓ -2%
Lã Merino	Kg	R\$ 15,00	↑ 7%
Lã Ideal	Kg	R\$ 11,00	↑ 10%
Lã Corriedale	Kg	R\$ 6,00	0%

Bovinocultura de Leite *










	Unidade	Preço (R\$)	Variação Mensal
Leite	Litro	R\$ 1,89	0%

* Coleta de preços realizada no dia 03/03/21 diretamente com corretores e pecuaristas. Os valores correspondem a média dos preços no mercado








Carne no Varejo

Corte Bovino	Preço Médio	Varição Mensal
Costela	R\$ 36,59	 23%
Vazio	R\$ 41,53	 9%
Picanha	R\$ 78,87	 29%
Linguiça	R\$ 25,97	 -4%
Carne Moída 1 ^a	R\$ 41,53	 -1%
Carne Moída 2 ^a	R\$ 19,50	 -19%
Patinho	R\$ 36,98	 5%
Coxão Mole	R\$ 45,10	 8%
Coxão Duro	R\$ 34,50	 -1%
Alcatra	R\$ 45,94	 8%

Coleta de preços realizada dia 03/03/21 em mercados e casas de carne em Uruguaiana.

Cortes Ovinos	Preço Médio	Varição Mensal
Paleta	R\$ 38,80	 -16%
Costela	R\$ 36,80	 -3%
Quarto	R\$ 34,47	 -8%
Espinhaço	R\$ 32,93	 -8%

Coleta de preços realizada no dia 03/03/21 em mercados e casas de carne em Uruguaiana

Insumos Veterinários - Vacinas

	Unidade	Preço Médio
Brucelose	Dose	R\$ 1,43
Clostridioses	Dose	R\$ 0,79
Febre Aftosa	Dose	R\$ 1,30
Leptospirose	Dose	R\$ 1,44
Raiva Bovina/ Equina	Dose	R\$ 1,14
IBR/BVD	Dose	R\$ 6,49
Carbúnculo Hemático	Dose	R\$ 0,57
Encefalomielite Equina, Tétano e Influenza Equina	Dose	R\$ 32,00
Foot Root	Dose	R\$ 3,06
Tétano	Dose	R\$ 10,00
Ceratoconjutivite	Dose	R\$ 3,03

Coleta de preços realizada no dia 03/03/21.

Média de preços estabelecida entre estabelecimentos comerciais agropecuários em Uruguaiana.



Insumos Veterinários - Medicamentos

	Unidade	Preço Médio
Antibiótico (Oxitetraciclina)	50 mL	R\$ 9,83
Antibiótico (Benzilpenicilinas)	50 mL	R\$ 30,67
Carrapaticida (Cipermetrina + Clorpirifós + Ethion)	1 L	R\$ 156,92
Carrapaticida (Fipronil)	5 L	R\$ 321,00
Carrapaticida (Fluazuron)	5 L	R\$ 421,00
Vermífugo (Sulfóxido de Albendazole)	1 L	R\$ 102,50
Vermífugo (Febendazole)	Seringa pasta	R\$ 8,90
Vermífugo (Doramectina)	500 mL	R\$ 175,33
Vermífugo Equinos (Ivermectina)	Seringa pasta	R\$ 16,25
Vermífugo Oral (Closantel)	1 L	R\$ 98,50
Triclorfon	Pó 500g	R\$ 97,17
Nitroxinil	500 mL	R\$ 201,67
Disofenol	1 L	R\$ 134,67
Monepantel	1 L	R\$ 797,50
Eprinomectina	500 mL	R\$ 142,00
Fosfato de Levamizol	250 mL	R\$ 27,83
Abamectina 1%	1 L	R\$ 134,07
Ivermectina 1%	1 L	R\$ 80,67
Ivermectina L.A 3,5	1 L	R\$ 330,67
Diclofenaco de Sódio	50 mL	R\$ 30,75
Antidiarréico Hiclato de Doxiciclina	50 mL	R\$ 36,73
Enrofloxacina 10%	50 mL	R\$ 73,50
Glicose 10% (Soro)	1L	R\$ 9,25
Soro Hiperimune (Tétano)	Dose	R\$ 9,33
Matabicheira Spray (Clorpirifós)	Frasco	R\$ 20,83
Matabicheira Líquido (Fenitrothion)	Frasco	R\$ 10,50
Benzoato de Estradiol	50 mL	R\$ 20,15
Cipionato de Estradiol	50 mL	R\$ 24,10
GnRH	50 mL	R\$ 178,47
Prostaglandina	20 mL	R\$ 37,60
Imaplante Mono	10 Un.	R\$ 134,00
Implante Tri	10 Un.	R\$ 190,00
EcG	5000 ui	R\$ 174,00

Coleta de preços realizada no dia 03/03/21.

Média de preços estabelecida entre estabelecimentos comerciais agropecuários em Uruguaiana.

Insumos - Diversos

	Unidade	Preço Médio
Adubo NPK - 5:20:20	Ton	R\$ 3.000,00
Adubo KCL	Ton	R\$ 2.288,00
Adubo MAP	Ton	R\$ 4.114,33
Adubo DAP	Ton	R\$ 4.114,00
Ureia - 45:0:0	Ton	R\$ 2.765,00
Calcário	Ton	R\$ 61,67
Brinco Identificação Bov.	Un.	R\$ 2,03
Brinco Identificação Ov.	Un.	R\$ 1,50
Isolador Tipo W (Cerca El.)	Un	R\$ 0,58
Tramas	Un	R\$ 3,43
Mourão	Un	R\$ 26,00
Arame Liso	1250m	R\$ 533,33
Arame de Atilho	Kg	R\$ 11,93

Coleta de preços realizada dia 03/03/21

Insumos - Nutrição Animal

	Unidade	Preço Médio
Sal Mineral 40 P	Kg	R\$ 1,59
Sal Mineral 65 P	Kg	R\$ 2,61
Sal Mineral 80 P	Kg	R\$ 2,74
Sal Proteinado 40 PB	Kg	R\$ 2,08
Ração Desmame de Terneiros - 18% PB	Kg	R\$ 1,99
Ração Manutenção 12% PB	Kg	R\$ 1,70
Milho	Kg	R\$ 2,07
Quirela	Kg	R\$ 1,55
Farelo de Arroz	Kg	R\$ 1,33

Coleta de preços realizada no dia 03/03/21

Pastagens da Estação

	Unidade	Preço Médio
Azevém	Kg	R\$ 4,35
Aveia Preta	Kg	R\$ 2,55

Coleta de preços realizada no dia 03/03/21

Relações de Troca

	Razão
Boi Gordo ² x Terneiro ³	1,90
Boi Gordo x Kg Sal Mineral 65P	1650,0
Boi Gordo x mL Antibiótico (Oxitetraciclina)	21904,88
Boi Gordo x Ton. Uréia	1,56
Boi Gordo x Salário Mínimo Nacional	3,92
Boi Gordo x Kg Ração - 18% PB	2164,07

²Boi de 450 Kg de peso vivo.

³Terneiro desmamado de 7-8 meses, com ~170 Kg



Siga-nos:  facebook.com/ctpec

 @ctpecunipampa

Desmama lado a lado garante menos estresse e melhor rendimento em bezerros de corte

Por: educapoint, Publicado em: 22/02/2019

O desmame de bezerros de corte no Brasil é tradicionalmente realizado entre 7-8 meses de idade. Nesta idade, o animal já pode ser considerado um ruminante e tem plena condição de utilizar forragem sólida como a única fonte de energia e de nutrientes que necessita. Além do mais, a participação do leite na dieta do bezerro é pequena após o terceiro mês de lactação.

A grande questão é que a época de desmama é um período de considerável estresse para vaca e bezerro. Em grande parte dos rebanhos de cria, a desmama é realizada de maneira abrupta, com a separação do par mãe/cria e concomitante manutenção das duas categorias em áreas distintas e, muitas vezes, afastadas.

O comportamento dos animais é previsível após a separação e pode ser detectado durante semanas após a desmama. Vacas e bezerros permanecem vocalizando repetidamente, passam mais tempo caminhando, ficando menos tempo se alimentando, ruminando e descansando.

Estas alterações de comportamento evidenciam que o método tradicional de aparte traz consequências negativas sobre o bem-estar animal. O resultado é claro: menor desempenho no período subsequente da recria e redução da imunidade, tornando o bezerro mais susceptível a doenças.

DESMAMA LADO A LADO

Uma das práticas mais adequadas para melhorar o bem-estar dos animais é a realização da desmama lado a lado, que é feita mantendo vacas e bezerros lado a lado, separados apenas por uma cerca. Desta forma os bezerros permanecem visualizando suas mães e vice-versa.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia-Davis verificaram que bezerros desmamados com visualização ganharam 30% mais peso que os animais desmamados tradicionalmente durante as dez primeiras semanas pós-desmama. A pesquisa mostrou que os bezerros andaram menos e também chamaram menos por suas mães.

Observações realizadas na EMBRAPA-CNPGC, com mães e crias desmamadas e separadas em pastos adjacentes, demonstrou maior tranquilidade, tanto para as vacas quanto para os bezerros, desde os primeiros dias.



Pesquisas da Embrapa também mostram que manter os animais em pastos adjacentes acalma os animais, levando-os mais rapidamente ao pastejo e à ruminção. No manejo lado a lado, há menor vocalização, ou seja, redução dos berros; além de maior tempo dos bezerros brincando e pastando, sinal de que estão saudáveis.

Há exemplos de desmama lado a lado com lotes de vários tamanhos, desde 80 até 200 animais. É importante, no entanto, que o acompanhamento de um vaqueiro seja feito pelo menos uma vez ao dia, pois há casos em que os animais passam pela cerca e outros que até conseguem mamar. No entanto, essas ocorrências são baixas e não anulam os benefícios obtidos.

Apesar disso, o fato das mães estarem logo à frente dos bezerros acaba sendo mais uma vantagem nos casos em que um ou outro bezerro consegue sair de sua cerca. Como as vacas estão logo à frente, o bezerro que escapa é facilmente encontrado, o que não ocorre quando as mães estão localizadas mais distantes e algum bezerro foge, podendo ficar perdidos na fazenda ou até mesmo se machucar nessa busca pela mãe.

Outro ponto a ser considerado é o acesso a bebedouros compartilhados entre vacas e bezerros ou bebedouros próximos. Isso porque, quando as vacas se afastam dos bezerros para beber água, eles ficam berrando e acabam não bebendo água em quantidade suficiente.

Confira abaixo algumas imagens do zootecnista, especialista em comportamento animal, mestre em zootecnia, doutor em psicobiologia e pós-doutor em bem-estar animal Mateus Paranhos, professor do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da UNESP, campus de Jaboticabal:

Protocolo adotado

- 1 Utilizar pastagens com boa disponibilidade de capim, sem obstáculos e mais planas.
- 2 A água deve ser compartilhada entre os dois piquetes ou visualmente próxima.
- 3 Vacas e bezerros são colocados durante três dias em um dos piquetes.
- 4 Durante esse período os vaqueiros colocam sal mineral e se possível uma suplementação para os bezerros (creep), andando no meio dos animais durante 15 minutos todos os dias.
- 5 No quarto dia as vacas são colocadas no piquete em frente aos bezerros e o manejo de caminhar entre os animais permanece o mesmo.
- 6 No sétimo dia as vacas são retiradas para outro piquete longe dos bezerros.
- 7 No décimo dia os bezerros podem ser retirados do piquete, preferencialmente com o auxílio de vacas madrinhas.

Este método realmente reduz o estresse dos bezerros. O importante é ter uma cerca resistente que diminua os riscos dos animais se juntarem novamente. Para facilitar o manejo, alguns criadores mantêm usualmente as crias no curral de quatro a sete dias pós-desmama, fornecendo água, ração no cocho e capim fresco à vontade.